

推奨 順	成分名	規格 (mg)	薬価 (円)	用法・用量(日)	上段;1日量(mg) [下段];1日薬価(円)				その他	
1	アムロジピン	2.5 5 10	10.1 10.1 10.1	2.5~5mg 最大 10mg	/	2.5 [10.1]	5 [10.1]	7.5 [20.2]	10 [10.1]	<p>・心血管イベント抑制効果; ニフェジピン、ニカルジピン、フェロジピン、アムロジピンにて示されている。</p> <p>・腎保護作用; T型、L型にてハードなエンドポイントは示されておらず、同程度であった。 T型;マニジピン、ベニジピン、アゼルニジピン、エホニジピン L型;アムロジピン、ニフェジピン</p> <p>安全性 どの薬剤においても降圧に関連する副作用以外は同程度であった。</p> <p>その他 ・CDSR(First-line drugs for hypertension)に組み込まれた試験のCCB;ニトレンジピン、アムロジピン、ニフェジピン、ニソルジピン、ニカルジピンのみ。他の薬剤は臨床試験は行われるものの、CDSRに組み込まれていなかった。 ・アムロジピン(粉碎・簡易懸濁可)、ニフェジピン(粉碎・簡易懸濁不可)</p> <p>※参考値</p>
1	ニフェジピン (1日2回)	10 20	5.7 5.9	20mg~40mg	/	10 [5.7]	20 [11.4]	40 [11.8]	/	
1	ニフェジピン (1日1回)	10 20 40	5.9 8.1 15.5	1日1回 10mg~40mg 最大 80mg	/	10 [5.9]	20 [8.1]	40 [15.5]	80※ [31.0]	
1	ニカルジピン	10 20	5.7 5.7	1回 10-20mg 1日3回	30 [11.4]	40 [11.4]	60 [17.1]	80	100	
1	フェロジピン	2.5 5	7.5/13.2	1回 2.5-5mg 1日2回 最大 1回 10mg 1日2回	/	2.5 [7.5]	5 [15]	10 [26.4]	20 [52.8]	
2	マニジピン	5/10/20	10.1/10.1 /16.5	初回 1日1回 5mg 維持 1日1回 10-20mg	/	5 [10.1]	10 [10.1]	20 [16.5]	/	
2	ベニジピン	2/4/8	10.1/12.5 /25.1	2~4mg 最大 8mg	/	2 [10.1]	4 [12.5]	8 [25.1]	/	
2	ニカルジピン 徐放	20 40	5.7 5.9	1回 20mg-40mg 1日2回	/	40 [11.4]	60 [11.6]	80 [11.8]	100	
2	シルニジピン	5/10/20	10.3/18.8 /29.2	1回 5-10mg 最大 20mg	/	5 [10.3]	/	10 [18.8]	20※ [29.2]	
2	ニトレンジピン	5/10	9.8/10.1	1日1回 5-10mg	/	5 [9.8]	/	10 [10.1]	/	
2	ニルバジピン	2/4	9.8/10.1	1回 2-4mg、1日2回	4 [19.6]	6 [19.9]	8 [20.2]	/	/	
2	アゼルニジピン	8 16	10.1 14.7	8~16mg	/	8 [10.1]	16 [14.7]	/	/	
3	バルニジピン	5/10/15	27.5/45.2 /65.6	1日1回 10-15mg	/	5 [27.5]	10 [45.2]	15 [65.6]	/	
3	アラニジピン	5 10	21.4/25.3	1日1回 5-10mg 最大 20mg	/	/	5 [21.4]	/	10 [25.3]	
3	エホニジピン	10/20/ 40	15.5/26.1 /48.7	1日 20-40mg 最大 60mg 1日 1-2回	/	20 [26.1]	40 [48.7]	60※ [74.8]	/	

2018年9月初版、2022年5月改訂第6版(2022年4月薬価)

